

Adiustip Duo

Integratore alimentare - Soluzione orale 200 ml

MODO D'USO

20 ml (pari a due cucchiaini) la sera

Informazioni nutrizionali

Apporto componenti nutrizionali	Per dose massima giornaliera 20 ml
Lattulosio	10 g
Succo concentrato di prugna	1 g
Fico estratto fluido	600 mg
Mannite	500 mg
Olio essenziale naturale di finocchio	20 mg



Materiale riservato esclusivamente ai Sigg. Medici



Coadiuvante nelle patologie correlate allo squilibrio intestinale:

- Riequilibrio del transito intestinale
- Intestino pigro
- Stitichezza acuta e cronica
- Stitichezza primaria
- Stitichezza secondaria
- Gonfiore addominale
- Stitichezza in gravidanza

Adiustip Duo

Soluzione orale 200 ml



Adiustip Duo

ADIUSTIP DUO è una soluzione orale composta da coadiuvanti fitoterapici ad azione osmotica favorenti la peristalsi e il transito intestinale.



Secondo l'American College of Gastroenterology, la stitichezza è una defecazione non soddisfacente caratterizzata da evacuazioni non frequenti e/o dal passaggio difficoltoso delle feci per almeno 3 mesi. La stipsi non è una malattia, ma un sintomo comune a molte malattie.

Stitichezza primaria

- Rallentato transito
- Alterazione della defecazione

Stitichezza secondaria

- Abuso di farmaci: oppioidi, anticolinergici, FANS, acido acetilsalicilico, antiacidi, antispastici, diuretici, antidepressivi, antistaminici
- Stile di vita
- Malattie connettivali, batteriche, metaboliche, neurologiche
- Disturbi psichiatrici




American College of Gastroenterology Guideline June 2017

Adiustip Duo

Il lattulosio è uno zucchero sintetico composto da due monosaccaridi: galattosio e fruttosio. Poiché l'organismo non è in grado né di digerire né di assorbire il lattulosio, questo prodotto avanza nel tubo digerente fino a raggiungere il colon. Metabolizzato dalla flora batterica del grosso intestino, il lattulosio provoca un aumento dell'acidità nel colon, stimolandone l'attività. In questo modo, si ha una maggiore ritenzione idrica a livello del colon, con conseguente ammorbidimento delle feci e maggiore facilità di evacuazione.

Agendo come sostanza prebiotica, il lattulosio favorisce la crescita di batteri benefici, mentre contrasta la proliferazione di batteri potenzialmente patogeni. In questo modo si può ottenere un più favorevole equilibrio della flora intestinale.



Ficus carica 500 mg




Figure 4. Effects of fig paste on change in segmental CTT for each experimental period (n=15). Bars with different letters from the control are significantly different ($P < 0.05$). Rt.: right, Lt.: left, Rs.: retrocecal.

Lo scopo del presente studio era di valutare l'effetto lassativo dei fichi misurando il peso delle feci e il tempo di transito del colon (CTT) dopo la somministrazione di pasta di fichi per 3 settimane in beagle con costipazione indotta da una dieta ricca di proteine e limitazione dell'esercizio.

Lo studio conclude che l'implementazione nella dieta di ficus ha aumentato il peso fecale, che era stata ridotta dalla stitichezza indotta dalla dieta proteica ed ha ridotto il tempo di transito del colon CTT.

Lab Anim Res 2011; 27(4), 275-281

MANNITE (500 mg)



SUCCO DI PRUGNA (1 g)



OLIO DI FINOCCHIO (20 mg)