

Coadiuvante nelle patologie correlate allo squilibrio intestinale:

- *Riequilibrio del transito intestinale*
- *Intestino pigro*
- *Stitichezza Acuta e Cronica*
- *Stitichezza Primaria*
- *Stitichezza Secondaria*
- *Gonfiore addominale*

MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Prendere secondo l'esigenza un cucchiaino o un cucchiaio di soluzione preferibilmente la sera. Può essere diluito in tisane o altre bevande calde.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Componenti nutrizionali	Per dose massima giornaliera 9 g.
Mannite (estratto secco)	700 mg
Ficus carica (estratto acquoso)	500 mg
Glycyrrhiza glabra radice (estratto acquoso)	140 mg
Malva sylvestris fiori (estratto acquoso)	140 mg
Foeniculum vulgare frutti (estratto secco)	130 mg
Rhamnus frangula corteccia (estratto secco)	100 mg
Cassia angustifolia foglie (estratto secco)	90 mg

150 ml



250 ml




DISPONIBILE IN 2 FORMATI

ADIUSTIP BIO è uno sciroppo composto da molecole estratte da piante officinali con l'obiettivo di contrastare i sintomi dello squilibrio intestinale favorendone la naturale funzionalità nei casi di gonfiore addominale e stipsi.

MANNITE (700 mg D-MANNITOLO)


D-MANNITOLO è uno zucchero monosaccaride derivato dalla Manna con proprietà lassative osmotiche, richiamando acqua nel lume intestinale aumenta il volume fecale e stimola la peristalsi. Il meccanismo d'azione della mannite non incide sulla curva di carico dei soggetti diabetici.

STIPSI E PERICOLOSI CIRCOLI VIZIOSI



Stitichezza Secondaria

- Abuso di farmaci: oppioidi, anticolinergici (paracetamolo, FANS, acido acetilsalicilico, antiacidi, antispastici, diuretici, antidepressivi, antistaminici)
- Stile di vita
- Malattie connettivali, batteriche, metaboliche, neurologiche
- Disturbi psichiatrici



American College of Gastroenterology Guideline June 2017

Ficus carica 500 mg

Effects of *Ficus carica* paste on constipation induced by a high-protein feed and movement restriction in beagles




Figure 4. Effects of fig paste on change in segmental CTT for each experimental period (n=15). Bars with different letters from the control are significantly different ($P < 0.05$). Rt.: right, Lt.: left, Rs.: rectosigmoid.

Lo scopo del presente studio era di valutare l'effetto lassativo dei fichi misurando il peso delle feci e il tempo di transito del colon (CTT) dopo la somministrazione di pasta di fichi per 3 settimane in beagle con costipazione indotta da una dieta ricca di proteine e limitazione dell'esercizio.

Lo studio conclude che l'implementazione nella dieta di ficus ha aumentato il peso fecale, che era stata ridotta dalla stitichezza indotta dalla dieta proteica ed ha ridotto il tempo di transito del colon CTT.

Lab Anim Res 2011; 27(4), 275-281

Glycyrrhiza glabra radice

Conosciuta anche come liquirizia svolge azioni antispasmodiche, utilizzata anche nell'ulcera duodenale e gastrica.

Phytother Res. 2018 Dec; 32(12): 2323-2339.

Malva sylvestris fiori

Il suo glucoside malvina agisce con attività lassativa osmotica non irritativa, e svolge funzioni di blanda attività antinfiammatoria.

Iran J Basic Med Sci, Vol. 14, No. 6, Nov-Dec 2011

Foeniculum vulgare frutti

Il finocchio inibisce la fermentazione degli zuccheri riducendo la produzione di gas.

BioMed Research International Volume 2014, Article ID 842674

Rhamnus frangula corteccia


La frangulina agisce nella stitichezza occasionale e cronica, ammorbidisce le feci utile in presenza di ragadi e emorroidi

Planta Med. 1984 Oct;50(5):449-51.

Cassia angustifolia foglie

Lassativo che richiama acqua tramite gli antrachinoni e stimolano le contrazioni del colon.

Clin Med (Lond). 2013 Feb;13(1):7-12.



Coadiuvanti Fitoterapici del transito intestinale ad azione Osmotica