

Adiustip^{PLUS}

Indicazioni

- Regolatore del transito intestinale.
- Regolatore della motilità gastrointestinale.
- Funzione digestiva.
- Eliminazione dei gas.

Informazioni nutrizionali

Apporto componenti nutrizionali	Contenuto per 100 grammi	Per dose massima giornaliera (un cucchiaino=10ml)
Frangula e.s. tit.	7 mg (estratto)	0.7 mg (estratto)
7.5% eterosidi	0.52 mg (eterosidi)	0.052mg (eterosidi)
Fico e.f.	5 mg (estratto)	0.5 mg (estratto)
Senna e.s. tit.	4 mg (estratto)	0.4 mg (estratto)
6% sennosidi	0.24 mg (sennosidi)	0.024mg (sennosidi)
Manna	2 mg (polvere)	0.2 mg (polvere)
Malva e.s.E/D:1/4	1 mg (estratto)	0.1 mg (estratto)
Tarassaco e.s. tit.	0.3 mg (estratto)	0.03 mg (estratto)
2% inulina	0.006 mg (inulina)	0.6 mcg (inulina)
Anice e.s. E/D:1/4	0.2 mg (estratto)	0.02 mg (estratto)
Carvi e.s. E/D:1/4	0.2 mg (estratto)	0.02 mg (estratto)
Finocchio e.s. tit.	0.2 mg (estratto)	0.02 mg (estratto)
0.5% olio essenziale	0.001 mg (olio ess.)	0.1 mcg (olio ess.)
Marrubio e.s.E/D:1/3	0.2 mg (estratto)	0.02 mg (estratto)
Menta e.s. E/D:1/4	0.2 mg (estratto)	0.02 mg (estratto)
Cannella	0.1 mg (polvere)	0.01 mg (polvere)

Posologia

10 ml (pari ad un cucchiaino) la sera

Bibliografia

Cathartics, Laxatives and Lavage Solutions.

Schiller, L. L. (1997) (Friedman, G., Jacobson, E. D. and McCallum, R. W., eds), pp. 159-174, Lippincott-Raven

Agents Affecting Gastrointestinal Water Flux and Motility; Emesis and Antiemetics; Bile Acids and Pancreatic Enzymes.

Brunton, L. L. (1996) (Hardman, J. G., Limbird, L. E., Molinoff, P. B., Ruddon, R. W. and Goodman Gilman, A., eds), pp. 917-936, McGraw-Hill

Recent findings on the mode of action of laxatives: the role of platelet activating factor and nitric oxide. Angelo A. Izzo, Timothy S. Gaginella et al. Receptors (Ganellin, C. R. and Parsons, M. E., eds), pp. 146-216, Wright-PSG TiPS - October 1998 (Vol. 19)



Materiale riservato esclusivamente ai Sig. Medici

Adiustip^{PLUS}


Adiustip^{PLUS}

DISPEPSIA


Riguarda tutto l'apparato digerente ed è caratterizzata da dolore e fastidio.

Le cause :


- **Organica**, quando è data dalla difficile digestione, causata da deficit d'enzimi necessari (es. malattie del pancreas)
- **Funzionale**, quando è data da problemi meccanici dell'apparato. (es. Helicobacter pylori)



Sinergia delle molecole Adiustip Plus



Meccanismo Sennosidi



Trends in Pharmacological Sciences

Volume 19, Issue 10, 1 October 1998, Pages 403-405



Recent findings on the mode of action of laxatives: the role of platelet activating factor and nitric oxide

Angelo A. Izzo^a, Timothy S. Gaginella^a, Nicola Mascolo^b, Francesco Capasso^b

^a University of Wisconsin, School of Pharmacy, Madison, WI 53706, USA.

^b Department of Experimental Pharmacology, University of Naples "Federico II", Via D. Montesano 49, 80131 Naples, Italy.



TARASSACO

Principi: Tarassosterolo e Taraxina.

Attività : coleretiche, antinfiammatorie, depurative.

MANNA

Principio: Mannitolo.

Attività: lassativo non irritativo. Può essere utilizzato anche in pazienti diabetici.

MARRUBIO

Principio: Marrubina.

Attività: l'acido marrubino regola la produzione della bile e la sua secrezione.