

Digercol

30 cpr

400 mg



Ingredienti: Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Calcio fosfato bibasico; Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti e.s. 1/4; Beta-galattosidasi 100.000 ALU/g da Aspergillus niger van Tieghem; Alfa-galattosidasi 30.000 GALU/g da Aspergillus niger van Tieghem; Carvi (Carum carvi L.) frutto e.s. 1/4; Agente di scorrimento: Magnesio stearato; Agente antiagglomerante: Silicio biossido.

Modo d'uso: Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse all'inizio dei pasti principali.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Informazioni nutrizionali:

Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico	Per 100 g	Per dose (2 compresse)
Finocchio e.s. 1/4	12,5 g	100 mg
Beta-galattosidasi 100.000 FCC ALU/g	11,25 g	90 mg
Alfa-galattosidasi 30.000 GALU/g	2,5 g	20 mg
Carvi e.s. 1/4	2,5 g	20 mg



senza glutine



senza lattosio

Contenuto:
30 compresse da 400 mg
Peso netto:
12 g e



987777048



www.cronav.it

cronav

Digercol

30 cpr

400 mg



**La soluzione efficace e specifica
per la gestione dei gas intestinali**

cronav

Digercol

integratore alimentare a base di:
Finocchio, Beta-Galattosidasi, Alfa-Galattosidasi, Carvi.

30 cpr

400 mg

Le principali cause del gas intestinale



**FLORA
BATTERICA**

**ALIMENTAZIONE
SCORRETTA**



**CATTIVA
DIGESTIONE**

**ARIA
INGERITA**



Digercol tratta e previene

cro.nav

Digercol


integratore alimentare a base di:
Finocchio, Beta-Galattosidasi, Alfa-Galattosidasi, Carvi.

30 cpr

400 mg

La soluzione efficace e specifica per la gestione dei gas intestinali

Il Finocchio e il Carvi regolano la motilità gastrointestinale (azione carminativa), migliorando la funzione digestiva e l'eliminazione dei gas.



La beta-galattosidasi mostrata nella figura qui a lato è un grosso enzima che svolge diverse azioni. La più importante è quella di realizzare la prima tappa nella produzione di energia: rompe il lattosio, il comune zucchero del latte, nei due zuccheri di cui è composto: glucosio e galattosio che possono così essere utilizzati dalla glicolisi.

L'integrazione di beta-galattosidasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che non lo digeriscono correttamente.

L'alfa-galattosidasi riduce i processi di fermentazione ed evita la produzione di gas intestinali aiutando l'assorbimento dei carboidrati complessi degli alimenti (amido da pane, pasta, riso, orzo, farro, mais e fibre vegetali da frutta, verdura, legumi e cereali).

Può essere somministrata anche durante la preparazione ad un'ecografia addominale al fine di ottenere una migliore visualizzazione ecografica degli organi studiati.

cro.nav