

NocoX ONE

Indicazioni

Stati di flogosi acuta
Stati di flogosi cronica
Drenaggio delle molecole infiammatorie
Dolore acuto e cronico
Dolori articolari

**SENZA GLUTINE****SENZA LATTOSIO**

Posologia

Si suggerisce di assumere 1 compressa al giorno.

Tabella sostanze caratterizzanti

Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico	Per 100 g	Per dose (1cpr)
Bromelina 2500 GDU/g Retard	40 g	400 mg
Ippocastano e.s. tit. 15% Escina di cui Escina	27 g 40,05 g	270 mg 40,5 mg
Meliloto e.s. tit. 20% Cumarina di cui Cumarina	10 g 2 g	100 mg 20 mg
Boswellia serrata e.s. tit. 65% Acidi boswellici di cui Acidi boswellici	10 g 6,5 g	100 mg 65 mg
Pilosella e.s. tit. 1% Vitexina di cui Vitexina	250 mg 2,5 mg	2,5 g 25 mcg



987801723



www.cronav.it

Materiale riservato esclusivamente ai Sig. Medici

NEW



NocoX ONE



Integratore alimentare 30 compresse da 1 g

NocoX^{ONE}

Nocox One riunisce 3 molecole che contrastano i processi di Flogosi Acuta e Flogosi Cronica. Superando la *barriera gastrica*, inibisce le vie dell'infiammazione e *drena* le molecole pro-infiammatorie.

BROMELINA 2500 GDU/g Retard 400 mg

NEW



La Bromelina retard microincapsulata supera la barriera gastrica ottenendo una maggiore biodisponibilità, mantenendo attivo l'enzima proteolitico bromelina, e facilitando la sua funzione antiflogistica senza creare alcuna interazione gastrica.

Studi in vivo e sull'uomo confermano che la bromelina ha efficacia sui pathways infiammatori agendo sulle prostaglandine pro-infiammatorie, sul trombossano e inibendo le citochine IL-6, IL-10, IL-8, TNF α e diversi recettori di membrana pro infiammatori come TLR4 (tramite PPAR γ).

Role of Bromelain as Herbal Anti-Inflammatory Compound Using In Vitro and In Vivo Model of Colitis Journal of Autoimmune Disorders ISSN 2471-8513 - Dec.2017 Compound Using In Vitro and In Vivo Model of Colitis Journal of Autoimmune Disorders ISSN 2471-8513 - Dec.2017




Figure 1. Real time analysis of (a) TLR4 expression, (b) PPAR γ , (c) IL-8 and (d) TNF α after treatment with bromelain (20 μ g/ml for 24 h) in 100 ng/ml LPS challenged HT29 cells. Values are mean of treatments performed in triplicates. Ct values were normalized against GAPDH and plotted relative to control. BRM=bromelain, C=Control. Statistical significance was calculated using student's t-test.




Figure 3. Effect of bromelain on DAI score in DSS treated and untreated mice. Data represents mean (n=5/group) $\pm$ SEM, Student t test was used to calculate significance level. a=significant difference from control group, b=significant difference from only DSS group.

IPPOCASTANO e.s. tit. 15% Escina 270 mg

Supporta la funzionalità del microcircolo ed il drenaggio dei liquidi corporei. Inoltre induce apoptosi nelle cellule di osteosarcoma e in altri modelli cellulari cancerogeni.

MELIOTO e.s. tit. 20% Cumarina 100 mg

Coadiuvata la funzionalità della circolazione venosa e del microcircolo

PILOSELLA e.s. tit. 1% Vitexina 2,5 g

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.

BOSWELLIA SERRATA e.s. tit. 65% Acidi boswellici 65 mg

Gli acidi boswellici agiscono inibendo la via delle 5-LOX e sinergizzano con la Bromelina nell'inibizione delle citochine pro-infiammatorie riducendone le concentrazioni, in particolare della IL-6 evitando la cronicizzazione del paziente.

Alti livelli di IL-6 per lunghi periodi possono indurre il passaggio da una flogosi acuta ad una flogosi cronica.




Grafico 1: Livelli serici di IL18, IL6, IL10 in bambini con faringotonsillite acuta trattati (Gruppo A) e non trattati (Gruppo B)

Livelli di IL 6, IL 10, IL 18 prima e dopo terapia con bromelina e acidi boswellici in bambini con faringotonsillite acuta: risultati preliminari.

Caterina Cuppari, Luisa Grasso, Valeria Ferrau, Antonella Talenti, Donatella Comito, Vincenzo Salpietro, Antonio Randazzo, Piera Vicchio, Andrea Deak, Romina Gallizzi, Basilia Piraino, Carmelo Salpietro. Dipartimento di Scienze Pediatriche, UOC di Genetica e Immunologia Pediatrica, Università di Messina.

The results of our study confirm the antiinflammatory action of these molecules.

They may represent a tool for the man.

Italian Journal of Genetic and Pediatric Immunology
Anno I numero 2 - luglio 2009